Rappel sur les mécanismes de transmission des microorganismes

IMS ACADEMIE – Correspondants HH 2025

Introduction

Une chaine de transmission (ou chaîne épidémiologique) comprend toujours :

- **Un agent infectieux** qui vit et se multiplie dans un réservoir dont il peut disséminer (porte de sortie)

- **Un hôte réceptif** avec une (ou plusieurs) porte(s) d'entrée pour l'agent infectieux

et entre les deux : **un mode de transmission**

Mécanismes de l'infection

L'agent infectieux

L'agent infectieux se trouve dans un **réservoir** qui correspond à son lieu de survie et de multiplication.

Le réservoir peut être :

- **Humain** (+++) : porteur sain, porteur asymptomatique, en période d'incubation, en période d'infection active (malade)

- **Animal**

- **Environnemental** (air, eau, aliment, sol, végétaux en décomposition, déjection animale...)

Modes de transmission (1)

Transmission horizontale d'une personne à une autre,

- par **Contact direct ou indirect** (dont la voie manuportée)
 - Gale, Infections entériques à transmission oro-fécale...
 - Cas particulier des infections associées aux soins : souvent contact indirect entre deux patients (manuportage, matériels...)
- par **Voie Aérienne** (aérosols-<5um)
 - Tuberculose = *Mycobacterium tuberculosis* (Bacille de Koch), varicelle, rougeole...
- par **Voie Gouttelettes** (>5um-gouttelettes de Pfügge)
 - Viroses respiratoires (ex : la grippe) ou méningite à méningocoque
- par **Voie Sexuelle**
 - Infections Sexuellement Transmissibles (syphilis, urétrite, infection VIH, hépatite B,...)
- par **Voie Sanguine**
 - Virus des hépatites B ou C, VIH, CMV, bactéries, paludisme...prions (transfusion ou blessure ou injection parentérale souillée, accident exposant au sang : AES)

Modes de transmission (2)

Transmission horizontale Directe d'un animal à un homme, on parle de Zoonose.

- par **Contact direct**
 - Morsure (ex : la rage via les chiens, les rats, les chauve-souris)
- par des **Liquides biologiques ou des excréments contaminés**
 - Contact avec urine de certains animaux (ex : Leptospirose via les rongeurs)
- par **Consommation d'aliments d'origine animale**
 - Viande (ex : variant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob responsable chez les bovins de la maladie dite de la vache folle)
 - Produits laitiers (ex : la listériose, la brucellose...)

Modes de transmission (3)

Transmission horizontale Indirecte avec un support ou un vecteur qui va alors véhiculer l'agent infectieux

- par **l'Eau et Aliments contaminés**
 - Salmonelles, shigelles, vibrions cholérique, amibes, virus de l'hépatite A, virus de la poliomyélite...
- via le **Sol**
 - Ascaris, ankylostomes, *Clostridium tétani*
- par **l'Air**
 - par exemple la légionnelle et les aérosols
- Par les **Arthropodes (vecteur)**
 - Moustique, mouche, tique : paludisme, dengue, fièvre jaune, maladie de Lyme...

Modes de transmission (4)

Transmission verticale mère-enfant

➤ Par Voie Hématogène Trans placentaire

- Pendant la grossesse et/ou au moment de l'accouchement (ex : rubéole, syphilis, toxoplasmose, VIH, hépatite B...)

Hôte réceptif

➤ Portes d'entrée des microorganismes :

- **Voie entérique** : oro-fécal +++ (ex : gastroentérite, ...)
- **Voie respiratoire** : toux, éternuements gouttelettes de Pflüge >5u, ou aérosols <5u (ex: tuberculose, grippe, ...)
- **Voie cutanéomuqueuse** (ex : AES, ...)
- **Voie uro-génitale** (ex : MST)
- **Voie parentérale** : tous les gestes invasifs (ponctions, injections, ...)

➤ Individu susceptible de développer l'infection :

- Selon ses **facteurs de risque**
- Selon ses **défenses immunitaires**
(ex: patient transplanté, sous traitement immunosuppresseur, nouveau-né, ...)

Les voies de pénétration des germes.

Deux types d'IAS selon l'origine du microorganisme

➤ Origine endogène

L'infection se réalise à partir d'un microorganisme dont le patient était porteur à l'admission (ou début des soins) et appartenant à la flore microbienne du patient.

➤ Origine exogène

Le microorganisme responsable de l'infection a été acquis lors du soins.

IAS d'origine exogène

Principes de la prévention

1. Interrompre la chaîne de transmission
2. Réduire et contrôler les portes d'entrée
3. Maîtriser les réservoirs (et/ou sortie)